

5. Monitorizar

- Si la dosis inicial no funciona, dé otra dosis en 2-3 minutos.
- Naloxona sólo restaurará la respiración para una sobredosis de opioides y durará 30-90 minutos.
- Permanecer con ellos lo mas que se pueda y continuar la respiración de rescate. Póngalos en la posición de recuperación.
- Si despiertan, pueden estar confundidos e incluso agitados. Oriéntelos a la situación, manténgalos tranquilos y evite que tomen más opioides.
- Después de completar una inversión por favor contáctenos para registrar el éxito del salvo!
- DHS.DOPP.coordinator@Illinois.gov

Datos de Naloxone:

- La investigación actual muestra que Naloxone ha Reducido la mortalidad en un 50% en muchas Comunidades.
- La naloxona es tan no tóxica como el agua y No adictiva y no tiene efectos adversos secundarios conocidos.
- Naloxona es accesible en las tiendas de medicinas Big Box: Pregunte a su farmacéutico
- Pregunte a su Departamento de Salud Pública, Hospital, agencia de Reducción de Daños y agencias de tratamiento para Oportunidades para entrenamiento y oportunidades para la distribución de naloxona.

Consideraciones legales

Ley Pública de Illinois 099-0480 (HB0001) aprobada Y entró en vigor el 9 de septiembre de 2015 como Mejora a la Ley Pública de Illinois 096-0361, a Permitir a las personas no médicas administrar Naloxona a personas que experimentan una Sobredosis de opioides y requiere de respuesta de emergencia como EMS, bomberos, Autoridades de la ley, Y los farmacéuticos para ser entrenados en administrar La naloxona a través de sus diversas maneras de administrar. La ley permite Personal entrenado, espectadores, personas interesadas, Miembros de la familia para obtener, poseer y administrar Naloxona a cualquier persona que Parece estar sufriendo un incidente relacionado con los opioides. Además, esta ley provee Protección civil y de la inmunidad penal para Profesionales del cuidado de salud y otras personas que Proporcionan y administran naloxona. Salvar vidas es el objetivo final!

Para más información sobre el Programa de Prevención de Sobredosis de Drogas (DOPP) de IDHS / DASA o para reportar un cambio de sobredosis Comuníquese con:

DHS.DOPP.coordinator@illinois.gov

División de Alcoholismo y Abuso de Sustancias
401 S. Clinton Street, 2nd Floor
Chicago, IL 60607
312-814-3840



Reconocimiento y respuesta a una sobredosis de opiáceos



Prevención

- El mal uso y el uso excesivo de opiáceos pueden conducir a un aumento de la tolerancia, cerebro, corazón y daño de órganos, lo que resulta en una sobredosis y muerte mortal.
- Promover la abstinencia de todas las drogas ilegales.
- Educar sobre el uso adecuado de los medicamentos recetados, y nunca mezclar con el alcohol.
- Asegurar el acceso al tratamiento con medicamentos (MAT) y a los centros de asesoramiento / tratamiento.
www.findtreatment.samhsa.gov
- El uso excesivo puede conducir a un aumento en la tolerancia, el cerebro, el corazón y los órganos, lo que resulta en una sobredosis y una muerte mortal.
- Ampliar el uso de Naloxona al ser entrenado y educado y alentar a otros a hacerlo.

Respuesta a la sobredosis: Un plan de 5 pasos

1. Reconocer la sobredosis

- La respiración será lenta o ausente
- Sonidos de ronquidos o gorgoteos presentes
- No hay respuesta a la llamada fuerte o agitación
- Labios o uñas de los dedos azules o grises
- Rostro pálido y la piel se siente fría y húmeda
- La parte central del ojo es pequeña.

2. Llame al 911 si no hay respuesta

- Mantenga la calma
- Sea específico: "La respiración de las personas se ha detenido y no responden a las órdenes".
- Sea claro, dé calles cruzadas o su ubicación exacta.

3. Administre Naloxone - Inyectable o spray nasal

A) Inyectable - Intramuscular


- Remueva la tapa del vial y gírela al introducir la aguja
- Tire hacia atrás del émbolo y llénelo hasta 1 ml (dosis única)
- Inyectar en el bíceps del brazo o músculo del muslo. Puede inyectarse a través de tela / ropa.

B) Aerosol Nasal - Intranasal

- Coloque a la persona de espaldas para recibir una dosis de Pulverizador nasal Narcan.
- Sostenga el spray nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo y los dedos primero y medio a cada lado de la boquilla.
- Inserte suavemente la punta de la boquilla en una fosa nasal hasta que sus dedos a ambos lados de la boquilla estén contra la parte inferior de la nariz de la persona.




NARCAN® (naloxona HCl) es la primera y única forma nasal aprobada por la FDA de naloxona para el tratamiento de emergencia de una sobredosis de opiáceos conocida o sospechada.



4. Coloque a la persona en posición de recuperación y respiración de rescate

- Inclina la cabeza hacia atrás y compruebe que las vías respiratorias están despejadas (asegúrese de que no haya vómito)



- Si la respiración sigue siendo severamente afectada a, (1 respiro cada 5-10 segundos) o la persona no ha comenzado a respirar otra vez, la respiración de rescate se debe hacer CUANTO ANTES porque es la manera más rápida de conseguir el oxígeno a la persona en necesidad.