



Si tiene alguna pregunta sobre alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias
1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y servicios que ofrece el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por favor llame o visite su Centro de Recursos Para Familias y Comunidad (FCRC). Contestaremos sus preguntas. Si no sabe dónde está su FCRC o si no puede ir hasta allá, llame a la línea automatizada de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:
8:00 a.m. - 5:30 p.m. Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet:

www.dhs.state.il.us



Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente a sus necesidades.



TRANQUILIZANTES

(Barbitúricos &
Benzodiacepinas)

Datos Que Usted Debe Saber



Los tranquilizantes son drogas que afectan el cerebro y el sistema nervioso central. Los barbitúricos y las benzodiacepinas son tranquilizantes. Tienen un efecto sedante, hipnótico, anticonvulsivo o anestésico. Comúnmente se encuentran en capsulas de varios colores y pueden ser recetados legalmente por un médico para el tratamiento de trastornos tales como el insomnio, la ansiedad, tensión nerviosa y ataques epilépticos.

Términos comúnmente usados para describirlo:

Barbs	Red devils
Yellow jackets	Block busters
Reds and blues	Christmas trees
Rainbows	Stumblers
Sleepers	Goof balls
Downers	Pinks

Métodos de Consumo:

Se ingiere Se inyecta

LOS EFECTOS AL USARLO:

Los barbitúricos y las benzodiacepinas producen un sentido de euforia y relajamiento. También son usados en conjunto con estimulantes como la cocaína, las anfetaminas y “crystal” “meth/crank” para reducir los síntomas desagradables de estos estimulantes.

LAS CONSECUENCIAS DESPUÉS DE QUE PASA EL EFECTO:

La tolerancia se desarrolla rápidamente y aumenta la cantidad de dosis, lo cual aumenta el peligro de una sobredosis. Si tiene una sobredosis junto con otras drogas como el alcohol, puede causar la muerte debido al efecto que estos tienen en centro respiratorio en el cerebro.

Efectos Secundarios:

Dificultad Para Hablar
Respiración Superficial
Pereza
Fatiga

Pupilas dilatadas
Deterioro de la memoria
Irritabilidad
Paranoia
Deterioro del juicio
Pensamientos suicidas
Falta de coordinación

Síntomas de Reajuste:

Temblores Sudor
Pulso elevado Vómitos
Ataques Trastorno del apetito
Halucinaciones Desorientación
Trastornos del sueño
Aumento de presión sanguínea

Fuentes de Información:

- <http://www.drugfreeamerica.org> ;
- <http://www.encyarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=001A0000> ;
- <http://www.lec.org/DrugSearch> ;
- <http://www.hfni.gsehd.gwu.edu/~sapc/barbiturates.htm> ;
- <http://www.ric.goer.state.ny.us/wbt/drugfree/drugs/depressa.html>

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de tratamiento de abuso de sustancias que hay en su comunidad, comuníquese con una de las siguientes líneas de ayuda

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

○ visite el siguiente sitio por Internet:
<http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator>