



Si tiene alguna pregunta sobre alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 (Voz, llamada gratis)
1-866-843-7344 (TTY, llamada gratis)

Si tiene preguntas sobre los programas y servicios que ofrece el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), por favor llame o visite su Centro de Recursos Para Familias y Comunidad (FCRC). Contestaremos sus preguntas. Si no sabe dónde está su FCRC o si no puede ir hasta allá, llame a la línea automatizada de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m. Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Visite nuestro sitio en el Internet:

www.dhs.state.il.us



Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente sus necesidades.



PCP

(Fenciclidina)

Datos Que Usted Debe Saber



La fenciclidina (PCP) es un polvo blanco cristalino con un sabor amargo químico característico. Fue desarrollado en los 1950s como un anestésico intravenoso. El uso del PCP en humanos fue discontinuado en 1965 porque se encontró que pacientes frecuentemente, cuando se recuperaban de su efecto anestésico, se agitaban, sufrían de alucinaciones y comportamiento irracional. Todavía se usa como tranquilizantes para animales.

Términos comúnmente usados para describirla:

Angel dust (polvo de angel)	
Rocket fuel	Mist
Dust	Elephant tranquilizer
Flying Saucers	Ozone
Peace pill	Wack

Cuando se mezcla con marihuana:
Crystal supergrass Killer joint

Métodos de Consumo:

El PCP puede ser ingerido, fumado, inhalado, o inyectado. Frecuentemente se usa con marihuana y anfetaminas.

LOS EFECTOS AL USARLO:

La experiencia del PCP es placentera la mitad de las veces. Puede producir euforia, relajamiento y puede aliviar el dolor.

LAS CONSECUENCIAS DESPUES QUE PASA EL EFECTO:

El PCP puede provocar muchos efectos negativos. Estos efectos a veces duran seis semanas. Las personas que usan el PCP por largos periodos de tiempo reportan dificultad con el lenguaje, depresión y pérdida de peso. Usuarios del PCP tienden a perder destrezas motoras finas y les afecta la memoria por corto plazo. La interacción entre el PCP y otros sedantes como el alcohol puede provocar coma y hasta la muerte.

Efectos Secundarios:

Alucinaciones
Temblores
Pronunciación incomprensible
Aumento en latidos del corazón
Vista borrosa
Entumecimiento
Hostilidad
Cambios en la Personalidad
Paranoia
Pánico
Vómitos
Desmayo
Babosear
Aumento en presión arterial
Cambios en la apariencia corporal

Fuentes de Información:

- <http://onhelath.com/conditions/condctr/substance/item,51699.asp> ;
- <http://www.drugfreeamerica.org> ;
- <http://www.lec.org/DrugSearch/Documents/Opiates.html>

LOCALIZADOR PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de tratamiento de abuso de sustancias que hay en su comunidad, comuníquese con una de las siguientes líneas de ayuda

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

○ visite el siguiente sitio por Internet:
<http://findtreatment.samhsa.gov/TreatmentLocator>